

3. What Problem Can Occur With The Catheter?

a) INFECTION:

Signs : Fever, feeling cold & shivering especially during dialysis. Redness, pain and pus over the skin where the catheter enters.

What to do : inform your doctor or nurses. You will need change of the catheter and antibiotic.

b) BLEEDING

Signs : Blood leaking out from the catheter

What to do : Compress the site of bleeding with clean cloth or gauze and present yourself to the dialysis unit or nearest hospital.

c) CATHETER SLIPPED OUT

What to do : Compress the site with clean cloth or gauze to stop bleeding. If the bleeding does not stop, maintain the compression and go dialysis unit or nearest hospital.

4. How To Take Care of The Catheter?

- DON'T apply anything over the skin where the catheter enters
- DON'T pull or bend the catheter
- DON'T wet your catheter
- Shower and swimming is not allowed
- Wet or soiled dressing needs to be changed

3. Apakah Masalah Boleh Berlaku Pada Pesakit Yang Menggunakan Katiter?

a) INFEKSI

Tanda: Demam, berasa sejuk & mengigil terutamanya semasa menjalani rawatan dialisis. Kawasan katiter dimasukkan pula kelihatan kemerahan, rasa sakit dan adakalanya bernanah.

Apa yang perlu dilakukan: Beritahu doktor atau jururawat dengan kadar segera. Katiter mungkin perlu ditukar dan rawatan antibiotik akan dimulakan

b) PERDARAHAN

Tanda: Terdapat darah keluar dari katiter .

Apa yang perlu dilakukan: Beri tekanan pada tempat berdarah dengan kain bersih atau goz dan datang segera ke unit dialisis PPUM atau hospital yang terhampir dengan rumah anda.


c) KATITER TERKELUAR

Apa yang perlu dilakukan : Beri tekanan pada tempat berdarah dengan kain bersih atau goz. Jika pendarahan tidak berhenti, teruskan tekanan dan datang segera ke unit dialisis PPUM atau hospital yang terhampir dengan rumah anda.

4. Bagaimanakah Penjagaan Katiter?

- JANGAN sapu minyak, bedak atau losyen pada kawasan katiter dimasukkan.
- JANGAN tarik atau bengkokkan katiter
- JANGAN basahkan katiter/"dressing "
- Mandi menggunakan shower dan berenang adalah tidak dilarang.
- Balutan dan dressing pada katiter yang basah dan kotor perlu ditukar.

wet or soiled dressing needs to be changed



DIALYSIS CATHETER CARE

Penjagaan Katiter Dialisis

PATIENT AND CARER GUIDE
PANDUAN UNTUK PESAKIT DAN PENJAGA

1. What is Dialysis Catheter?

Dialysis catheter is a plastic tube inserted into a blood vessel in order to allow blood to be drawn out and circulated through the dialysis machine.

The catheter/tube is not meant to be permanent. It is designed to be used temporarily while waiting for your arteriovenous fistula (AVF) surgery.

A fistula is a connection between your own vessels and is created by a surgeon.



AVF surgery should be done as soon as possible.

1. Apakah Katiter Dialisis

Katiter dialisis adalah satu tiub yang dimasukkan pada salur darah bertujuan untuk pengaliran darah keluar dan masuk semasa rawatan hemodialisis dilakukan.

Katiter ini akan digunakan untuk sementara waktu sahaja sehingga pembedahan arteriovenous fistula yang dilakukan menjadi matang dan boleh digunakan.

Fistula adalah sambungan salur darah yang dilakukan secara pembedahan oleh pakar bedah.

Disediakan Oleh:

Rawatan Harian Dialisis
Tel : 03-79492746/ 2747

Sebarang Pertanyaan Sila Hubungi

Perkembangan Kejururawatan, Tingkat 8, Menara Utama
Pusat Perubatan Universiti Malaya, 59100 Kuala Lumpur
Tel : 03-79492376/ 2931/ 2798/ 2412

Hak milik Pusat Perubatan Universiti Malaya 2011

2. Where is The Catheter Inserted?

The neck is the usual place where the dialysis catheter/ tube is inserted. The catheter is called an "IJC". Under certain circumstances, the catheter may have to be inserted over the groin (upper thigh area), in those cases, it is called a "femoral" catheter.



The femoral catheters carry very high risk of infection and **SHOULD NOT BE KEPT FOR MORE THAN 1 WEEK.**

2. Dimanakah Katiter Dimasukkan?

Lokasi yang biasa katiter dimasukan adalah pada leher. Katiter tersebut dipanggil 'IJC'

Dalam kes tertentu, katiter mungkin perlu dimasukkan pada salur darah pada bahagian kelengkang dan ianya dipanggil 'Katiter Femoral'.

Pesakit dengan katiter Femoral berisiko tinggi untuk mendapat infeksi dan **HANYA BOLEH DIGUNAKAN UNTUK TEMPOH SATU MINGGU SAHAJA** . Ini adalah untuk mengelakkan pesakit mendapat komplikasi.